



Observer pour des fourrages de qualité

Note Fourrages

Un réseau régional pour faciliter vos décisions

Note N°8 – semaine 16 – lundi 17 avril 2017

Sommes températures base 0-18 au 1^{er} février Source Météo France 15/4/17

Saint Germain Laval - 420m

Croissance : 80 kg MS/j/ha (86kg/j /ha sur 15j)

Boën - 430m

Somme de t° : 702° à partir du 1^{er} février

Chalmazel - 990m

Somme de t° : 441° à partir du 1^{er} février

Saint Maurice en Gourgois - 780m

Croissance : 72 kg MS/j/ha (55kg/j /ha sur 15j)

Perreux - 279m

Somme de t° : 688° à partir du 1^{er} février

Commelle Vernay - 340m

Croissance : 52 kg MS j/ha (67kg/j /ha sur 15j)

Andrézieux Bouthéon - 400m

Somme de t° : 691° à partir du 1^{er} février

Grammond - 804m

Somme de t° : 603° à partir du 1^{er} février

Saint Paul en Jarez - 410m

Croissance : 105 kg MS j/ha (98kg/j /ha sur 15j)

Froid et manque d'eau vont ralentir la croissance

Le manque d'eau n'avait pas encore limité la croissance de l'herbe fin de semaine dernière. Mais s'ajoute le froid de ces jours : la pousse va ralentir.

En fonction des parcelles (altitude, exposition, profondeur du sol, date de mise à l'herbe), le stock d'herbe varie. Il faut le consommer tant que l'herbe est de qualité. En effet, le temps de ces jours favorise une épiaison précoce comme on peut le voir en plaine et sur les coteaux les plus chauds. Il faut néanmoins protéger les prairies d'un surpâturage qui limiterait leurs réserves dans la gaine. Privilégiez une hauteur de sortie assez haute : à 6 cm.

Ensilage d'herbe à terminer en plaine

Les premiers ensilages ont débuté depuis une quinzaine de jour. Ils se poursuivent cette semaine dans d'excellentes conditions. La hauteur d'herbe n'est pas forcément très élevée mais la végétation est dense. La qualité est au rendez-vous à ce stade. L'épiaison des orges et des graminées dans les prairies naturelles tend à terminer les fauches précoces en plaine.

Privilégier le pâturage en montagne

En montagne, le déprimage est encore possible cette semaine si la quantité d'herbe n'est pas suffisante sur les parcelles pâturées. Néanmoins, il est impératif de terminer rapidement le premier tour de pâture pour éviter de se faire dépasser dans les prochaines semaines.

Sommes de températures : comment les utiliser ?


Apports azotés :

Entre 200° base 0-18° au 1^{er} janvier et 200° base 0-18° au 1^{er} février

Mise à l'herbe : entre 250° et 300° base 0-18° au 1^{er} février

Fin de déprimage à 500° base 0-18 au 1^{er} février

Ensilage à 700° base 0-18 au 1^{er} février



Retrouver nous sur le site <http://www.fidocl.fr>

Contact : Florence FARGIER

06 74 88 65 37 ffargier@loire-conseil-elevage.fr

Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal



LOIRE
CONSEIL ÉLEVAGE



AGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE



AGRICULTURE
PEP
BOVINS LAIT