



## ***A retenir cette semaine :***

La pousse d'herbe est de 32 kg MS/ha/jour de moyenne sur le département ; soit plus de 50 % de moins que la moyenne des 10 dernières années.

Fauche possible sur tous les secteurs avant une semaine prochaine annoncée plus perturbée...



## ***Réseau suivi croissance d'herbe :***

| Localisation               | Hauteur (cm) | Kg MS/ha/Jour | Mise à l'herbe |                               |
|----------------------------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| St Marcel de Félines, 490m | 9,6 cm       | 7 kg          | 6/04           | 100 % pâture<br>30 ares / UGB |
| Violay, 700m               | 8,1 cm       | 12 kg         | Jour / nuit    | 90 % d'herbe fraîche          |
| Fontanès, 750m             | 9,5 cm       | 45 kg         | 07/04          | 3/4 ration d'herbe            |
| St Christo En Jarez – 800m | 8,2 cm       | 43 kg         | Jour / nuit    | 100% pâture                   |
| St Héand, 700m             | 8,4 cm       | 26 kg         | Jour / nuit    | 3/4 herbe pâturée             |
| Savigneux, 400m            | 8,6 cm       | 39 kg         | 17/03          | 1/2 ration d'herbe            |
| Apinac, 1000 m             | 7 cm         | 45 kg         | 13/04          | 50% herbe pâturée             |
| Dancé, 400 m               | 10,4 cm      | 40 kg         | Jour / nuit    | 65 % pâture                   |
| St Galmier                 | -            | -             | Jour / nuit    | 100 % herbe pâturée           |



## ***Sommes de température :***

Nettoyage / déprimage : 250 °C

Mise à l'herbe : 300 °C -> Forsythias en fleurs

Apport fauche tardive : 300-350°C

Ensilage herbe précoce type RGI : entre 650°C et 700 °C → floraison des Lilas

Méteils : entre 800 et 900°C

Foin précoce : 900°C



## ***Du côté de la technique :*** limiter les pertes au champ en système foin

Les différentes opérations entraînent des pertes plus ou moins importantes. Les feuilles et notamment celles des légumineuses sont les plus impactées. La valeur alimentaire des fourrages se trouvent principalement dans les feuilles. Pour ce faire, toutes les interventions devraient se réaliser en dehors des périodes chaudes de la journée, en matinée après la disparition de la rosée ou en fin de journée.

| Stations météo    | Somme T°C depuis 01/02 | Cumul pluvio. Mai |
|-------------------|------------------------|-------------------|
| Bard              | 809                    | 15,2              |
| Burdignes         | /                      | /                 |
| Noirétable        | 812                    | 8,8               |
| St Sauveur en Rue | 822                    | 15,5              |
| Violay            | 849                    | 17                |



## Montagne et plateaux

Poursuite des 1<sup>ère</sup> coupes et des récoltes de méteils dans un objectif qualité. Des croissances d'herbe très variable imposant sur certains secteurs l'agrandissement du tour de pâture sur des parcelles de fauche.

| Stations météo       | Somme T°C depuis 01/02 | Cumul pluvio. Mai |
|----------------------|------------------------|-------------------|
| Fourneaux            | 955                    | 10,2              |
| La Valla en Gier     | 931                    | 9,2               |
| Panissières          | 923                    | 14,1              |
| St Georges en Couzan | 858                    | 17,8              |



## Coteaux

Début des foin précoce avec l'atteinte des 900°C. en raison des conditions sèches, il est nécessaire de récolter les parcelles en espérant le retour des pluies significatives pour les 2<sup>ème</sup> coupe.

| Stations météo | Somme T°C depuis 01/02 | Cumul pluvio. Mai |
|----------------|------------------------|-------------------|
| Arthun         | 912                    | 5,2               |
| Balbigny       | 959                    | 2,2               |
| Nandax         | 929                    | 6,4               |
| Pélussin       | 1044                   | 9,5               |
| Savigneux      | 915                    | 13,5              |
| Veauchette     | 949                    | 4,6               |



## Plaine

Les croissances d'herbe sont très faible, il est conseillé d'agrandir le tour de pâture où augmenter la complémentation au bâtiment.

Fauche en foin possible cette semaine dans un objectif qualité.

Source infoclimat / météo France au 14/05/2022



Enrubannage sur St Christo En Jarez et pâturage jour et nuit



Retrouvez nous sur le site <http://www.fidocl.fr>

Contact : Stéphane LAURENT  
slaurent@loire-conseil-elevage.fr

Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal



Retrouvez nous sur le site <http://www.chambre-agriculture.fr>

Contact : Pierre VERGIAT  
Pierre.vergiat@loire.chambagri.fr

Chambre d'Agriculture – 42155 St Priest En Jarez