



Observer pour des fourrages de qualité

Note Fourrages

Un réseau régional pour faciliter vos décisions

Note N°17 – semaine 23 – lundi 1^{er} Juin 2020

Sommes températures base 0-18 au 1^{er} février. Source Météo France 01/06/20

Roanne – 336m

Somme de t° : 1250°C + 89°C

Arthun – 350m

Somme de t° : 1219°C + 89°C

Bard – 810m

Somme de t° : 1118°C + 96°C

Savigneux – 380m

Pousse : 30 kg ms d'herbe /ha/jour

St Bonnet le Chateau – 870m

Somme de t° : 1067°C + 84°C

St Maurice en Gourgis – 600m

Hauteur moyenne : 8.8 cm
Croissance à 28 kg MS/ha/jour
Fauche des refus – semis sorgho et millet x trèfle d'Alexandrie après ensilage des méteils

Point météo :

Au mois de mai à la station d'Andrézieux, il est tombé 61 mm de pluie (normale à 92 mm) soit un déficit cumulé depuis le 01/01 de 35%. Avec 149 mm de cumulés au 31/05, nous sommes exactement comme 2019 au mm près.

Le mois de mai aura été le 10^{ème} mois consécutif avec une température moyenne au-dessus des normales. Actuellement, l'année 2020 est l'année la plus précoce depuis 2010.

Croissance de l'herbe :

- Les croissances d'herbe poursuivent leur décroissance « normale » à cette saison. Il est temps d'agrandir les tours de pâture afin de laisser un temps de repousse plus long entre deux passages.

- Les températures annoncées sous 10 jours devraient être en dessous des normales, et quelques orages très localisés pourraient se produire.

Que faire cette semaine : fauche sur tous les secteurs

- Zone de plaine et de coteaux (400-800m) : le seuil des 1 200°C a été atteint. Les foin tardifs doivent se terminer.

- Zone de montagne (> 800m) : pleine période pour les foin. Atteinte des 1200°C dans une dizaine de jours.


Zoom technique : comment limiter les pertes lors de la récolte en foin ?

Fauche : en fonction du type de matériel (faucheuse rotative, conditionneuse à fléaux ou à rouleaux), les pertes peuvent aller jusqu'à 10%.

Séchage : dès la fauche la surface d'exposition du fourrage doit être la plus importante possible

Fanage et andainage : toujours sur fourrage ré humidifié et avec un régime de prise de force de 350 – 400tr/min

Pressage : en matinée, avec un liage filet de préférence, en moyenne densité.



Ressins – 330 m

Pousse : 64 kg ms d'herbe /ha/jour

Parigny – 400 m

Pousse : kg ms d'herbe /ha/jour

Violay – 830m

Somme de t° : 1144°C + 94°C

Panissières – 600 m

Pousse : 34 kg ms d'herbe /ha/jour

St Etienne Andrézieux – 400m

Somme de t° : 1339°C + °C

Chazelles sur Lyon – 550 m

Pousse : kg ms /ha/jour

Veauchette – 360m

Somme de t° : 1261°C + 88°C

Pélussin – 400m

Somme de t° : 1362°C + 109°C

Bilan fourrager, ou en êtes-vous dans vos stocks ?

La période de semis des dérobées est bientôt arrivé, il est temps de faire un premier état des stocks.

Les besoins en kg MS/jour sont de :

- bovin adulte : entre 15 et 17 kg MS/jour,
- génisses de plus de 2 ans : 10 kg MS/jour,
- génisses de 1 à 2 ans : 7 kg MS/jour,
- génisses de moins de 1 an : 4 kg MS/jour
- caprin et les ovin : entre 1.7 et 2.2 kg MS/animal/jour.

Les stocks :

- Ensilage d'herbe : 225 kg MS/m³ (30%MS, silo 1.5m de haut)
- Enrubannage : 240 kg MS/balle ronde de 120x120 à 60% MS
- Foin : 170 kg MS/balle ronde de 120x120

Retrouver nous sur le site <http://www.fidocl.fr>

Contact : Stéphane LAURENT

slaurent@loire-conseil-elevage.fr

Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal

Retrouver nous sur le site <http://www.chambre-agriculture.fr>

Contact : Pierre VERGIAT

Pierre.vergiat@loire.chambagri.fr

Chambre d'Agriculture – 42155 St Priest En Jarez

