



Météo de l'herbe



Bulletin des Savoie du 18 avril 2012

	Pousse moyenne quotidienne du 06/04 au 13/04		Le point sur les stades au 14/04 (prairies productives et précoces)	
	kgMS/ha/jour	Chargement théorique (ares/vache)	Somme de température (°C _{jour})	Stade indicatif
Combe de Savoie (300m)	85	19	500	Epi 5cm
Avant pays (300m)	/	/		
Albanais (400m)	97	16	470	Déprimage
Poisy (500m)	67	24		
Chablais (600m)	/	/		
Bornes (800m)	47	34		
Moyenne	74 (-21)	23		

Pousse de l'herbe : elle reste soutenue à basse altitude. Plus haut, le temps froid et venté la pénalise. En moyenne, une surface de 23 ares de pâtures par VL permet de produire suffisamment d'herbe pour les animaux.

Stades : avec le temps frais, l'avancée des stades ralentit et le retard avec 2011 se creuse. A basse altitude, la montaison démarre lentement. Les 500 degrés jour, correspondant au stade épi à 5cm, sont atteints à ces altitudes. Ce repère est à retenir pour la fin des déprimages de prés de fauche.

Conseils de la semaine : à basse altitude, limiter la surface à 20-25 ares de pâtures maximum par VL : la pression de pâturage doit être importante pour maîtriser l'herbe. Si possible, conserver pour la fauche les parcelles où l'herbe est trop haute (>15cm à l'herbomètre). Plus haut, poursuivre la distribution de fourrages conservés pour ne pas surpâturer.



*Le 24 avril
L'AFTA_{lp} organise sa
Journée Herbe au
centre d'élevage de
Poisy. Venez
nombreux !*