



Météo de l'herbe

Bulletin des Savoie du 25 avril 2012

	Pousse moyenne quotidienne du 13/04 au 20/04		Le point sur les stades au 21/04 (prairies productives et précoces)	
	kgMS/ha/jour	Chargement théorique (ares/VL)	Somme de température (°C _{jour})	Stade indicatif
Combe de Savoie (300m)	106	15	573	Montaison
Avant pays (300m)	92	17		
Albanais (400m)	64	25		
Poisy (500m)	67	24		
Chablais (600m)	/	/	449	Déprimage
Bornes (800m)	54	30	372	
Moyenne	77 (+3)	22		

Pousse de l'herbe : elle reste soutenue à basse altitude. Plus haut, le temps froid et pluvieux a été moins favorable. En moyenne, **un chargement théorique de 22 ares de pâtures par VL** permettrait de produire suffisamment d'herbe pour les animaux au pâturage. Avec l'arrivée de la chaleur, la pousse devrait s'accélérer significativement.

Stades : malgré la fraîcheur, **les stades progressent** et le stade épiaison (repère 750°Cj) va arriver très rapidement à basse altitude (10-15 jours). Les épis sont en cours de montaison dans les gaines des feuilles jusque vers 500-600m.

Conseils de la semaine : les conditions climatiques défavorables au pâturage ont permis **la création de stocks sur pieds importants, qui vont favoriser une pousse très rapide** lors du retour de la douceur. Cette année, **le risque de débordement par l'herbe est donc très élevé.** Appliquer une pression de pâturage importante (20-25 ares/VL) pour faire consommer rapidement les épis en montaison

