



Patur'RA, Observer pour mieux pâturer un réseau Régional pour faciliter vos décisions

Somme de températures

	8-avril 2012	8 avril 2011
CHABEUIL-AERO-DE-VALENCE	532	606
ROMANS-SUR-ISERE	532	599
COMBOVIN	337	414
LUS-LA-CROIX-HAUTE	327	379

Somme de températures mi-mars .
Comparaison 2012 / 2011. calculs Arvalis-
Institut du Végétal, données Météo France




Pousse de l'herbe 2012 proche de 2011

Sur des prairies rases, la pousse de l'herbe avait démarré lentement au LA Valentin : 41 kg de MS / ha / jour fin mars et elle a rejoint la moyenne régionale sur la première semaine d'avril (61 kg de MS / ha / jour).

Globalement sur notre réseau Régional patur'RA, la moyenne de la pousse 2012 est quasi identique à celle de 2011.

Les mesures ont démarré cette semaine sur le Vercors, les premiers résultats de pousse vous seront communiqués la semaine prochaine.

POUSSE DE L'HERBE 2011. Moyenne Région Rhône-Alpes



Conseils de la semaine

En montagne Pour ceux qui ont une **faible surface par vache** et qui rentrent souvent en sur-pâturage, la sortie doit être retardée, et pour les conventionnels, un apport d'engrais minéral contenant de l'Azote est souhaitable. Pour ceux qui sont débordés chaque année par la pousse, se caler sur les dates de sortie 2011 si la portance le permet.

En **plaine**, la transition doit être accélérée. Avec une pousse de 60 kg de MS/ha et par jour, et 20 ares de surface pâturée par vache, les vaches doivent ingérer 12 kg de MS / jour pour que la quantité d'herbe ne s'accumule pas sur le pâturage.

Mardi 10 avril 2012

Patur'RA n° 2

Jean Pierre Manteaux 04.75 70 69 34

06 22 42 53 88

